

DOSES MÁXIMAS RECOMENDADAS

Droga	Lidocaína 2% com epinefrina 1:100.000			Articaína 4% com epinefrina 1:100.000 ou 1:200.000**			Prilocaína 3% com felipressina 0,03% UI/mL			Mepivacaína 3% sem vasoconstritor		
Dose máxima	4,4 mg/kg (até 300)*			7mg/kg (até 500)*			6mg/kg (até 400mg)*			4,4 mg/kg (até 300)*		
mg/tubete	36			72			54			54		
	Peso (kg)	n° max. de tubetes	mg	Peso (kg)	n° max. de tubetes	mg	Peso (kg)	n° max. de tubetes	mg	Peso (kg)	n° max. de tubetes	mg
	10	1	44	10	¾	70	10	1	60	10	¾	44
	15	1 ½	66	15	1	105	15	1 ½	90	15	1	66
	20	2	88	20	1 ½	140	20	2	120	20	1 ½	88
	25	2 ½	110	25	2	175	25	2 ½	150	25	2	110
	30	3 ½	132	30	2 ½	210	30	3	180	30	2	132
	35	4	154	35	3	245	35	3 ½	210	35	2 ½	154
	40	4 ½	176	40	3 ½	280	40	4	240	40	3	176
<p>*A dosagem máxima total absoluta de anestésico por consulta não deve ser excedida. Tabela considerada em pacientes ASA I.</p> <p>**A Articaína não é indicada para menores de 4 anos, por recomendação do fabricante. Alguns autores consideram a dosagem máxima de 5mg/kg,.</p> <p>Adaptada de Malamed (2004) In: Massara e Rédua (2014). Colaboração Profa. Dra, Carla Gamba</p>												

